

Metanefrinas e Catecolaminas

Pré Requisitos e Dietas

Receção/Execução Analítica: Segunda-feira a Sábado

Amostra: Sangue, Urina ocasional ou Urina de 24 Horas

Preparação do utente:

- 5 dias antes da colheita não ingerir fruta (principalmente bananas, laranjas e ananás), queijo, chocolate, doces, caramelos, gelados, bebidas com gás, álcool, café e tabaco.
- Se colheita de sangue, para este teste, deve estar em jejum mínimo de 6 horas.
- 72 horas antes deve suspender medicação com sulfonamidas, tetraciclina, hipotensores, tranquilizantes, sedativos, benzodiazepinas, inibidores da MAO, levodopa, reserpina, adrenalina, teofilina e nitroglicerina

Nota: A alteração à medicação apenas deve ser feita com autorização do médico assistente.

Urina Temporizada | 3H ou 24H

Instrução de Colheita

Receção/Execução Analítica: Segunda-feira a Sábado
Amostra: Urina

Instrução de Colheita:

- Registe o peso (em Kg) e a altura (em cm) no rótulo do contentor.
- Esvazie por completo a bexiga. Registe a hora exata em que o fez. Este é o momento do início da contagem do tempo.
- Mediante o tempo de recolha que o médico pediu, verifique e registe a hora para terminar a colheita de urina.
- Até essa hora **TODA** a urina tem de ser colocada no contentor, mesmo que implique colheita durante a noite
- A última recolha de urina deve ser à hora final da colheita.
- Entregue a urina o mais rapidamente possível.

Nota: Há análises que obrigam a colheita em contentor com aditivo: Nesse caso:

- Não retire o aditivo do contentor.
- Não urine diretamente para o contentor! o aditivo pode provocar queimaduras!
- Urine para um recipiente limpo e verta a urina cuidadosamente (evitando salpicos) para o contentor com aditivo.

Se pedida a análise Clearance da Creatinina:

- A determinação da clearance da creatinina necessita de colheita de sangue e urina de 24H.
- A colheita de sangue deve ser no dia em que inicia ou termina a colheita de urina.

Se pedida a análise Peptídeo C:

- A urina **TEM** de ser mantida refrigerada e entregue na unidade de colheita até **1H30** após a última recolha.
- Não terminar a recolha em dia/hora em que a unidade de colheita está encerrada.
- Ao entregar a urina, avise a unidade que se trata de colheita para Peptídeo C.

Conservação e transporte: Refrigerado

Condições de inaceitabilidade: incumprimento do tempo e instrução de colheita.